

PSYKIATRISKT FORMULÄR

1. Anamnesens tillförlitlighet

1. Anamnes u a
2. Anamnes u v a, ej helt säker sista åren
3. Anamnes sannolikt otillförlitlig
4. Anamnes helt otillförlitlig
5. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms u a
6. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms u v a
7. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms sannolikt otillförlitlig
8. Anamnes erhöles i vissa delar, helt otillförlitlig
- 9.

p 2401 14

2. Tid för samtal i minuter

....
p 2402 15-16

3. Aktuell äktenskaplig situation, gäller sista äktenskapet

0. Aldrig gift eller sammanboende
1. Sammanboende nu men ej gift
2. Gift nu
3. Änka eller änklings sedan mer än 5 år
4. Änka eller änklings sedan 1-5 år
5. Änka eller änklings sedan 0-1 år
6. Fränskild eller separerad

p 2403 17

4. Sorgereaktion för änka/änklings

0. Inaktuellt
1. Ingen eller ringa reaktion
2. Lätt reaktion, psykoterapi ej indicerad
3. Måttlig - stark reaktion, ambulans psykoterapi indicerad
4. Djup, kraftig reaktion. Slutens psykiatrisk vård indicerad
- 9.

p 2404 18

5. Sorgereaktionens duration

- 0. Inaktuell
- 1. 0-1 månad
- 2. 1-6 månader
- 3. 6-12 månader
- 4. 1-2 år
- 5. 2-5 år
- 6. Mer än 5 år
- 7. Pågår alltjämt

9.

P2405 ○ 19

6. Aktuell äktenskaplig situation. Gäller sista äktenskapet

- 0. Aldrig gift eller sammanboende
- 1. Sammanboende nu men ej gift
- 2. Gift nu
- 3. Frånskild eller separerad sedan mer än 5 år
- 4. Frånskild eller separerad sedan 1-5 år
- 5. Frånskild eller separerad sedan 0-1 år
- 6. Änka, änking

9.

P2406 ○ 20

7. Makes hälsa

health of spouse

- 0. Ej gift
- 1. Frisk, i huvudsak frisk *senare illa*
- 2. Kroppsligt sjuk *— psykisk illa*
- 3. Psykiskt sjuk inkl. dement *— psykisk illa*
- 4. 2+3

9.

P2407 ○ 21

8. Äktenskapet nu - tillfredsställelse

- 0. Ej gift
- 1. Mycket lycklig
- 2. Ordinärt
- 3. Olyckligt

9.

P2408 ○ 22

9. Åldersupplevande

- 1. Ung (minst 20 år yngre)
- 2. Medelålders (minst 10 år yngre)
- 3. Gammal (äldre än faktisk ålder)
- 4. Ungdomlig (gammal men ung till sinnet)
- 5. Ibland ung, ibland gammal
- 6. Ibland medelålders, ibland gammal
- 7. Tar inte direkt ställning, samma som tidigare, inte märkt någon skillnad, känner sig som 83

9.

P2409 ○ 23

10. Tänker Ni ofta tillbaka på livet?

1. Aldrig
2. Enstaka gång
3. En gång per vecka
4. Flera gånger per vecka
5. Dagligen

9.

P2410 24

11. Hjärnblödning, propp i hjärnan

0. Nej
2. Ja, vård i hemmet, 1-2 år sedan
2. Ja, vård i hemmet, mindre än 1 år sedan
3. 1+2
4. Ja, sjukhusvårdad, 1-2 år sedan
5. Ja, sjukhusvårdad, mindre än 1 år sedan
6. 4+5
7. Osäkra uppgifter, möjligen förekommit

9.

Om pos. fråga om fokala symptom, om ep.

P2411 25

12. Är Ni absolutist nu?

0. Nej
2. Sedan 0-1 år
2. Sedan 1-2 år
3. Sedan 2-5 år
4. Sedan 6-10 år
5. Sedan 11-15 år
6. Sedan mer än 15 år men inte alltid
7. Ja, alltid

9.

P2412 26

13. Öl sista månaden

0. Absolutist
1. Nej
2. 1-2 gånger per vecka eller mindre
3. 3-5 gånger per vecka
4. Nästan dagligen eller dagligen lättöl eller pilsner, mindre än 1 flaska
5. Dagligen eller nästan dagligen mellanöl, mindre än 1 flaska
6. Dagligen eller nästan dagligen lättöl eller pilsner, mer än 1 flaska
7. Dagligen eller nästan dagligen mellanöl, mer än 1 flaska
- 8.
- 9.

P2413 27

14. Vin sista månaden

- 0. Absolutist
- 1. Nej
- 2. 1-2 gånger per vecka eller mindre
- 3. 3-5 gånger per vecka
- 4. Dagligen
- 5. Ibland som medicin
- 6. 3-5 gånger per vecka, som medicin
- 7. Dagligen som medicin
- 9.

P2414 ○ 28

15. Starksprit sista månaden

- 0. Absolutist
- 1. Nej
- 2. Mindre än 1 gång per vecka
- 3. 1-2 gånger per vecka
- 4. 3-5 gånger per vecka
- 5. Nästan dagligen eller dagligen
- 6. Ibland som medicin
- 7. 3-5 gånger per vecka som medicin
- 8. Dagligen som medicin
- 9.

P2415 ○ 29

16. Mängd starksprit/vecka

- 0. Inaktuellt
- 1. Mindre än 37 cl
- 2. 37-75 cl
- 3. 75-150 cl
- 4. 150-200 cl
- 5. Mer än 200 cl
- 9.

P2416 ○ 30

17. Grovt uppskattad total alkoholkonsumtion per vecka omräknad i gram alkohol per vecka

- 0. 0
- 1. 0-20
- 2. 20-40
- 3. 40-60
- 4. 60-100
- 5. 100-150
- 6. 150-250
- 7. 250-500
- 8. Mer än 500
- 9.

P2417 ○ 31

18. Återställarbehov, minneslucka, triggermekanism

P2418

32

0. Alltid absolutist
1. Nej
2. Återställare
3. Minneslucka
4. Triggermekanism
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

19. Psykisk sjukdom i någon grad har förekommit i följande åldersintervall

P2419
P2536

33-34

- 81-82 års ålder
82-83 års ålder

För varje åldersintervall anges följande alternativ

0. Ej förekommit
1. Förekommit
2. Osäker uppgift

Beskriv närmare:

20. Pågående behandling för psykisk sjukdom

P2420

35

0. Psykiskt frisk
1. Ingen
2. Sömnmedel enbart och endast om det används minst en gång per vecka
3. Poliklinisk terapi, ej psykiater
4. Poliklinisk terapi, psykiater
5. Inlagd somatisk avdelning
6. Inlagd psykiatrisk sjukhusavdelning
7. Inlagd psykiatrisk sekundärvård
8. Står på väntelista för intagning för någon form av psykiatrisk vård
- 9.

21. Sänkt sinnesstämning.

2421

36

Avser uppgift om sinnesstämning oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av nedstämdhet, olycklighet, tungsinnhet, hopplöshet och hjälplöshet. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken grad sinnesstämningen påverkas av yttre omständigheter. Förhöjd sinnesstämning skattas "0".

- 0-1 Neutralt stämningsläge. Kan känna såväl tillfällig munterhet som nedstämdhet, alltefter omständigheterna, utan övervikt för ena eller andra stämningsläget.
- 2-3 Övervägande upplevelse av nedstämdhet men ljusare stunder förekommer.
- 4-5 Genomgående nedstämd och dyster till sinnes. Sinnesstämningen påverkas föga av yttre omständigheter. Tillfälliga upplevelser av intensiv nedstämdhet.
6. Genomgående upplevelse av maximal nedstämdhet.
- 9.

22. Förhöjd sinnesstämning

Avser uppgift om sinnesstämning, oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av välbefinnande, munterhet och upprymdhet.

Bedömningen baseras på intensitet, duration och avledbarhet.

Särhålles från extatiska upplevelser ().
Sänkt sinnesstämning skattas "0".

0. Neutralt stämningsläge. Kan känna såväl tillfällig nedstämdhet som tillfällig munterhet, alltefter omständigheterna, utan övervikt för det ena eller andra stämningsläge 0,1
1. Övervägande upplevelser av välbefinnande eller munterhet men perioder av neutralt stämningsläge förekommer 2,3
2. Genomgående upprymd eller väl till mods. Sinnesstämningen påverkas knappast av yttre omständigheter. Långa perioder av översvallande gott humör 4,5
3. Genomgående upplevelse av strålande välbefinnande eller intensiv upprymdhet 6
- 9.

23. Minskat känslomässigt engagemang.

Avser en upplevelse av minskat intresse för omvärlden, eller för sådana aktiviteter som normalt bereder nöje eller glädje. Reducerad förmåga att uppleva adekvata känslomässiga reaktioner inför människor och företeelser i omgivningen.

- 0-1 Normal förmåga till känslomässigt engagemang. Normalt intresse för omvärlden.
- 2-3 Svårigheter att finna nöje i sådant som vanligen väcker intresse. Minskad förmåga att bli arg eller irriterad.
- 4-5 Helt ointresserad av omvärlden. Upplevelse av likgiltighet inför vänner och bekanta.
6. Total oförmåga att känna adekvat sorg eller vrede. Total eller smärtsam likgiltighet och oförmåga att uppleva känslor även för närstående.
- 9.

24. Blödighet, lätthet att gråta, att känna sig rörd

- 0-1 Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck
- 2-3 Tendens till blödighet vid måttliga stimuli
- 4-5 Upprepad förekomst av blödighet vid måttliga eller minimala stimuli
6. Minimala affektiva stimuli utlöser blödighet som ej kan kontrolleras
- 9.

2422 ○ 37

2423 ○ 38

2424 ○ 39

25. Blödighet, nytillkommen

0. Har aldrig haft lätt för att gråta
1. Alltid ungefär lika lätt att gråta, ingen förändring
2. Har alltid haft ganska lätt för att gråta men mer nu
3. Har inte haft lätt att gråta tidigare men har det nu
4. Hade det lättare för att gråta förr i världen

9.

2425 ○ 40

26. Förmåga att behärska blödighet

1. Samma som tidigare
2. Något sämre än tidigare
3. Mycket sämre än tidigare
4. Bättre än tidigare

9.

2426 ○ 41

27. Aggressiva känslor

Avser upplevelse av aggressiva känslor, oavsett om dessa får något uttryck i beteendet eller ej. Bedömningen baseras på upplevelsernas intensitet, frekvens och den grad av provokation som framkallar dem.

Oförmåga att känna vrede skattas "0" (jämför också item, minskat känslomässigt engagemang).

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ingen ökad retlighet | 0,1 |
| 1. | Lättare än vanligt att bli irriterad men känslan förflyktigas snabbt | 2,3 |
| 2. | Upplevelser av ilska eller vrede även vid obetydlig provokation | 4,5 |
| 3. | Långvarig ilska, känslor av raseri eller intensivt hat som är svåra eller omöjliga att behärska | 6 |

9.

2427 ○ 42

28. Tendens att bli irriterad, nytillkommen

0. Aldrig lättirriterad
1. Alltid lika lättirriterad, ingen förändring
2. Alltid lättirriterad men mer nu
3. Ej lättirriterad tidigare men nu
4. Blivit mindre lättirriterad än förr

9.

2428 ○ 43

29. Förmåga att behärska irritabilitet

1. Lika bra som tidigare
2. Något sämre än tidigare
3. Mycket sämre än tidigare
4. Bättre än tidigare

9.

2429 ○ 44

30. Svårighet att vara ensam

○ 45

(Är aldrig ensam skattas "0").

2430

- 0-1 Nej. Trivs med ensamheten.
 2-3 Något svårt men iakttar ingen åtgärd.
 4-5 Svårt, iakttar åtgärd.
 6. Kan inte vara ensam ens en kort stund.

9.

31. Svårigheter med att vara med andra

○ 46

2431

- 0-1 Inga svårigheter, trivs med sällskap
 2-3 Något svårt, iakttar ingen åtgärd.
 4-5 Svårt, iakttar åtgärd
 6. Kan inte vara bland folk, har endast absolut nödvändiga kontakter
 7. Har ingen att vara tillsammans med

9.

32. Ängestkänslor.

2432 ○ 47

Avser känslor av vag psykisk olust eller obehag, ängest, skräck eller inre oro som kan stegras till panik. Särhålles från ängslighet () och sänkt sinnesstämning ().

- 0-1 Mestadels lugn.
 2-3 Tillfälliga vaga känslor av psykisk olust eller odefinierbar rädsla.
 4-5 Ständig känsla av inre oro, någon gång stegrad till panik som endast med viss svårighet kan bemästras.
 6. Långdragna panikattacker. Överväldigande känslor av skräck eller dödsängest som ej kan bemästras på egen hand.

9.

33. Smärtor och värk

2433 ○ 48

Avser upplevelser av kroppsliga obehag, värk eller smärtor.

Skattas på bas av intensitet, frekvens och duration, och också på krav om smärtlindring. Skattas oavsett eventuell organisk bakgrund.

Särhålles från hypokondri (), muskelspänning () och vegetativa störningar ().

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga eller endast snabbt förflyktigade smärtor | 0,1 |
| 1. | Tillfälliga smärtor eller värk | 2,3 |
| 2. | Långvariga och besvärande smärtor eller värk, Krav på smärtlindring | 4,5 |
| 3. | Intensiva eller invalidiserande smärtor | 6 |

9.

34. Ängslighet

Avser överdriven ängslighet, tendens att gruva sig och oroa sig i förväg i olika situationer. Bedömningen baseras på intensitet, avledbarhet och omfattning.

Särhålles från ångestkänslor, hypokondri, tvångstankar, depressivt tankeinnehåll och fobier.

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ingen överdriven ängslighet | 0,1 |
| 1. | Lätt att "oroa sig i onödan", "ta ut oron i förskott", men kan själv slå bort sina funderingar | 2,3 |
| 2. | Ängslig och bekymrad t o m inför vardagliga rutinhandlingar | 4,5 |
| 3. | Invalidiserande ängslighet, ständigt grubbel över småsaker. Lugnande försäkringar har ingen effekt | 6 |

9.

35. Hypokondriska idéer

Avser överdriven oro för den kroppsliga hälsan och orealistiska föreställningar om kroppslig sjukdom.

Särhålles från smärtor, ängslighet och bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner.

Bedömningen baseras på föreställningarnas intensitet och graden av avledbarhet.

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ingen överdriven oro för den egna hälsan | 0,1 |
| 1. | Överdriven reaktion på eller föreställning om betydelsen av smärre kroppsliga obehag. Överdrivna farhågor för kroppslig sjukdom | 2,3 |
| 2. | Tror sig ha någon kroppslig sjukdom, men kan tillfälligt övertygas om motsatsen | 4,5 |
| 3. | Invalidiserande eller bisarra hypokondriska idéer (t ex att kroppen ruttnar, eller att inte ha haft avföring på månader) | 6 |

9.

36. Depressivt tankeinnehåll.

Avser självförebräelser, självanklagelser, föreställningar om synd och skuld, mindervärdighet, ekonomisk ruin och hopplöshet inför framtiden.

- | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-1 | Inga pessimistiska tankar. |
| 2-3 | Fluktuerande självförebräelser och mindervärdesidéer. |
| 4-5 | Ständiga självanklagelser. Klara, men orimliga tankar om synd eller skuld. Uttalat pessimistisk framtidssyn. |
| 6. | Absurda föreställningar om ekonomisk ruin. Absurda självanklagelser. |

9.

2434 ○ 49

2435 ○ 50

2436 ○ 51

37. Livsleda och självmordstankar.

2437 ○ 52

Avser upplevelser av livsleda, dödsönskning och självmordstankar samt förberedelser för självmord. Eventuellt suicidförsök påverkar ej i sig skattningen.

- 0-1 Ordinär livslust. Inga självmordstankar.
- 2-3 Livsleda, men inga eller endast vaga dödsönskningar.
- 4-5 Självmordstankar förekommer och självmord betraktas som en tänkbar utväg, men ingen bestämd suicidavsikt.
- 6. Uttalade avsikter att begå självmord när tillfälle bjuds. Aktiva förberedelser för självmord. Tankar på utvidgat självmord.

9.

38. Storhetsidéer

2438 ○ 53

Avser överskattning av den egna personens betydelse, förmåga eller hälsa.

Särhålls från förhöjd sinnesstämning och extatiska upplevelser.

- 0. Inga storhetsidéer 0,1
- 1. Självsäker. Tenderar att överskatta sitt eget status 2,3
- 2. Stark överskattning av egen betydelse och förmåga. Vidlyftiga och orealistiska framtidsplaner 4,5
- 3. Absurda storhetsidéer 6

9.

39. Hänsyftnings- och förföljningsidéer

2439 ○ 54

Avser misstänksamhet och en upplevelse av att vara observerad, åsyftad eller förföljd

Särhålls från upplevelser av kontroll och styrning.

- 0. Ingen överdriven misstänksamhet 0,1
- 1. Svag känsla av att vara observerad. Tillfälliga misstankar om att andra människor har onda avsikter gentemot en 2,3
- 2. Stark upplevelse av att andra människor "talar om en". Starka misstankar om att vara hotad eller förföljd 4,5
- 3. Okorrigerbar övertygelse om att vara offer för systematisk förföljelse. Feltolkningar av triviala händelser, "ledtrådar" eller "bevis". Ogrundad övertygelse om att vara omtalad i t ex tidningar eller television 6

9.

40. Svartsjukeidéer

Avser en överdriven upptagenhet av tankar om att vara bedragen av partnern i en erotisk relation.

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga svartsjukeidéer. Ingen överdriven misstänksamhet gentemot partnern | 0,1 |
| 1. | Vag känsla av osäkerhet om partners trohet | 2,3 |
| 2. | Söker efter och misstolkar "bevis" på otrohet | 4,5 |
| 3. | Systematiserade svartsjukeidéer som dominerar tanke-
livet och tar sig uttryck i hotfullhet gentemot partners,
eventuellt i avsikt att pressa fram bekännelser | 6 |
| 4. | Ingen partner | 7 |
| 9. | | |

2440 ○ 55

41. Upplevelser av kontroll och styrning

Avser en upplevelse av att i bokstavlig bemärkelse vara påverkad eller styrd utifrån, och en upplevelse av att känslor, impulser eller intentioner inte är ens egna. Hit föres också motsvarande upplevelse av att kunna påverka eller styra andra.

Särhålls från hänsyftnings- och förföljelseidéer samt störningar i tankeförloppet.

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga påverkningsupplevelser | 0,1 |
| 1. | Vaga eller ej övertygande beskrivningar av att vara styrd utifrån | 2,3 |
| 2. | Tillfälliga men tydliga upplevelser av kontroll eller styrning som under hypnos | 4,5 |
| 3. | Ständiga upplevelser av att känslor eller intentioner inte härrör från det egna jaget, utan styrs utifrån t ex via radiovågor eller kosmisk strålning (jämför item övriga vanföreställningar) | 6 |
| 9. | | |

2441 ○ 56

42. Övriga vanföreställningar

Avser alla vanföreställningar som inte kan föras till de ovan beskrivna

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga övriga vanföreställningar | 0,1 |
| 1. | Vaga, ej övertygande beskrivningar av övrigt patologiskt tankeinhåll | 2,3 |
| 2. | Klar förekomst av övrigt patologiskt tankeinhåll. Övervärdiga idéer | 4,5 |
| 3. | Absurda vanföreställningar, som eventuellt manifesterar sig i handling | 6 |
| 9. | | |

2442 ○ 57

43. Kommenterande röster

2443

○ 58

Avser upplevelsen av att höra sina tankar uttalade högt, eller upprepade, eller att höra röster som kommenterar ens handlingar eller talar om en i tredje person.

Särhålles från andra hörselhallucinationer.

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga hallucinerande kommenterande röster | 0,1 |
| 1. | Vaga eller föga övertygande beskrivningar | 2,3 |
| 2. | Tydliga hallucinerade röster | 4,5 |
| 3. | Frekventa hallucinerade röster som interfererar med beteendet | 6 |

9.

44. Andra hörselhallucinationer

2444 ○ 59

Avser hallucinerade ljud eller röster med undantag av kommenterande röster. Innefattar även rösthallucinationer som är kongruenta med ett sänkt stämningsläge, t ex "samvetets röst" i samband med ett depressivt tankeinnehåll.

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga hörselhallucinationer utöver eventuella hypnagoga fenomen | 0,1 |
| 1. | Feltolkningar av auditiva stimuli. Vaga eller ej övertygande beskrivningar av hörselhallucinationer | 2,3 |
| 2. | Tydliga hallucinationer som kan vara frekventa men inte nödvändigtvis påträngande | 4,5 |
| 3. | Högljudda eller obehagliga hörselhallucinationer. Imperativa hallucinationer | 6 |

9.

45. Synhallucinationer

2445 ○ 60

Avser feltolkningar av visuella stimuli (illusioner) eller falska visuella perceptioner i avsaknad av ytre stimuli (hallucinationer).

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga synhallucinationer utöver eventuella hypnagoga fenomen | 0,1 |
| 1. | Tillfälliga illusioner | 2,3 |
| 2. | Ofta förekommande eller ständiga illusioner, eller tillfälliga synhallucinationer | 4,5 |
| 3. | Tydliga, frekventa eller ständiga synhallucinationer | 6 |

9.

46. Övriga hallucinationer

Avser hallucinationer för smak, lukt och hörsel.

Ange för vilken eller vilka sinnesmodaliteter. Om hallucinationer för flera sinnen förekommer baseras skattningen på den mest uttalade.

Typ av hallucination

.....

0.	Inga hallucinationer	0,1
1.	Vaga eller ej övertygande beskrivningar	2,3
2.	Enstaka tydliga hallucinationer	4,5
3.	Frekventa eller kontinuerliga hallucinationer	6

9.

47. Störningar i tankeförloppet

Avser upplevelser av tankestopp, tankedetraktion och tankepåsättning samt upplevelser av att tankarna kan läsas av andra eller "sändas ut", som via radio.

Särhålles från koncentrationssvårigheter och tvångstankar.

0.	Ingen upplevelse av störningar i tankeförloppet	0,1
1.	Vaga eller ej övertygande beskrivningar av avbrott i tankeströmmen	2,3
2.	Tillfälligt men otvetydigt tankestopp, eller enstaka upplevelser av tankedetraktion eller tankepåsättning. Upplevelse av att ens tankar läses	4,5
3.	Invalidiserande störningar i tankeförloppet. Upplevelse av att ens tankar sänds ut, som via radio	6

9.

48. Koncentrationssvårigheter

Avser svårigheter att samla tankarna och koncentrera sig.

Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken mån olika aktiviteter försvåras.

Särhålles från störningar i tankeförloppet och minnesstörningar.

0.	Inga koncentrationssvårigheter	0,1
1.	Tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade vid tex läsning eller TV-tittande	2,3
2.	Uppenbara koncentrationssvårigheter som försvårar läsning och andra aktiviteter	4,5
3.	Kontinuerliga, invalidiserande koncentrationssvårigheter	6

9.

2446 ○ 61

2447 ○ 62

2448 ○ 63

49. Minnesstörningar

Avser upplevelser av försämrat minne i förhållande till det för den skattade ordinära.

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ingen subjektiv minnesstörning | 0,1 |
| 1. | Tillfälliga minnesstörningar | 2,3 |
| 2. | Genomgående minnesstörningar som måste bemästras med speciella åtgärder - fråga andra, föra anteckningar | 4,5 |
| 3. | Upplevelser av total oförmåga att minnas | 6 |
| 9. | | |

2449 ○ 64

50. Relation mellan när- och fjärrminne

1. Närminnet = fjärrminnet
2. Fjärrminnet bättre än närminnet
3. Närminnet bättre än fjärrminnet
4. Fjärrminnet möjligen bättre än närminnet
5. Närminnet möjligen bättre än fjärrminnet
- 9.

2450 ○ 65

51. Uttröttbarhet

Avser upplevelser av minskad uthållighet och ökad uttröttbarhet i olika aktiviteter i förhållande till det för patienten ordinära

Särhålles från initiativlöshet.

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ordinär uthållighet | 0,1 |
| 1. | Upplevelser av ökad trötthet, men kan hålla ut med en aktivitet i ordinär omfattning | 2,3 |
| 2. | Klart ökad uttröttbarhet. Måste ta pauser eller byta sysselsättning avsevärt oftare än ordinärt | 4,5 |
| 3. | Extrem uttröttbarhet, som medför att alla aktiviteter avbrytes efter en kort stund, eller omöjliggöres | 6 |
| 9. | | |

2451 ○ 66

52. Trötthet, tid på dagen

0. Ej trött
1. På morgonen
2. Mitt på dagen
3. På eftermiddagen
4. På kvällen
5. Morgon + kväll
6. Annan kombination
7. Enbart efter ansträngning
8. Hela dagen
- 9.

2452 ○ 67

53. Obeslutsamhet

Avser avårighet att fatta beslut i enkla valsituationer. Särhålls från tvångstankar

0. Ingen obeslutsamhet 0,1
 1. Upplever sig som obeslutsam, men kan fatta beslut när så erfordras 2,3
 2. Obeslutsamhet som fördröjer eller eventuellt förhindrar aktiviteter, medför svårigheter att svara på enkla frågor eller välja mellan olika alternativ 4,5
 3. Utpräglade valsvårigheter t o m i sådana situationer som vanligen inte kräver ett medvetet beslut (sitta eller stå, gå ut eller stanna kvar) 6

9.

54. Initiativlöshet.

Avser den subjektiva upplevelsen av initiativlöshet, känslan av att behöva övervinna ett motstånd innan en aktivitet kan påbörjas. Särhålls från uttrötthet () och obeslutsamhet ().

- 0-1 Ingen svårighet att ta itu med nya uppgifter.
 2-3 Lätta ingångsättningssvårigheter.
 4-5 Svårt att komma igång även med rutinuppgifter.
 6. Oförmögen att ta initiativ till de enklaste aktiviteterna.
 Kan inte påbörja någon verksamhet på egen hand.

9.

55. Är Er sömn tillfredsställande?
(gäller förhållandena sista månaden)

1. Ja
 2. Inte helt
 3. Inte alls
 4. Ja, med sömntabletter
 5. Inte helt med sömntabletter
 6. Inte alls med sömntabletter

9.

56. Minskad nattsömn

Avser uppgifter om minskad sömntid eller sömndjup i förhållande till de ordinära sömnvanorna

- 0-1 Sover som vanligt.
 2-3 Måttliga insomningssvårigheter eller kortare, ytligare eller oroligare sömn än vanligt.
 4-5 Minskad sömntid (minst 2 timmar mindre än normalt), vaknar ofta under natten även utan yttre störningar
 6. Mindre än 2-3 timmars sömn totalt.

9.

2453 ○ 68

2454 ○ 69

2455 ○ 70

2456 ○ 71

57. Ökad sömn

Avser uppgifter om ökad sömntid eller sömndjup i förhållande till de ordinära sömnvanorna

- 0-1 Sover som vanligt.
- 2-3 Sover längre eller tyngre än vanligt.
- 4-5 Somnar avsevärt tidigare eller vaknar avsevärt senare (flera timmar) än vanligt.
- 6. Tillbringar en stor del av dygnet sovande.

9.

2457

72

58. Om Ni har sömnsvärigheter, hur yttrar sig dessa?

- 0. Inaktuell
- 1. Svårt att somna in (>1/2 timmas latens)
- 2. Vaknar för tidigt på morgonen
- 3. Vaken flera gånger under natten
- 4. Annat, såsom

.....

- 5. 1+2
- 6. 1+3
- 7. 2+3
- 8. 1+2+3

9.

2458

73

59. Om sömnproblem föreligger, hur länge har Ni haft dessa?
Angiv antal år (<1 år=1 år)

....

2459

74-75

60. Har Ni haft sömnproblem?
(Gäller personer utan sömnmedel och utan aktuella besvär)

- 1. Nej, har aldrig upplevt detta
- 2. Ja, haft det ibland (1 gång per månad - 1gång per vecka)
- 3. Ja, ofta (1-3 gånger per vecka)
- 4. Ja, regelbundet (>3 gånger per vecka)
- 5. Ja, har haft det tidigare men ej nu

9.

2460

76

61. Om Ni har eller har haft sömnproblem, hur började dessa?

- 0. Inaktuell
- 1. Ingen särskild orsak
- 2. Egen sjukdom
- 3. Närståendes sjukdom
- 4. Pensionering
- 5. Närståendes bortgång
- 6. Annat, såsom

.....

- 7. 3+5
- 8. Kombinationer med alternativ 4
- 9.

2461

77

62. Vilken tid brukar Ni somna (ange helt klockslag)?
Obs! Alla klockslag skall anges från 0-24.

.....

P 2462

 78-79

63. När brukar Ni vakna på morgonen (ange helt klockslag)?
Obs! Alla klockslag skall anges från 0-24

2463
.....
 80-81

64. Vaknar Ni under natten?

1. Aldrig
2. Mindre än en natt per vecka
3. En natt per vecka
4. 1-2 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
5. 3-5 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
6. Varje eller nästan varje natt en gång per natt
7. Varje eller nästan varje natt två gånger per natt
8. Varje eller nästan varje natt tre eller flera gånger per natt
- 9.

2464

 82

65. Vilar Ni eller sover Ni under dagen?

1. Nej
2. Sover ej, vilar 0-1 timma
3. Sover ej, vilar mer än 1 timma
4. Sover 0-1 timma per dag
5. Sover 1-2 timmar per dag
6. Sover mer än 2 timmar per dag
- 9.

2465

 83

66. Slumrar Ni till under dagen?
(kort slumrer i fätölj el. dyl, probanden skall ej gå till sängs)

1. Nej
2. Ja, ≤ 1 gång per vecka
3. Ja, 1 gång per vecka
4. Ja, 1-2 gånger per vecka
5. Ja, 3-5 gånger per vecka
6. Ja, dagligen eller nästan dagligen
(en till ett par gånger per dag)
7. Ja, dagligen eller nästan dagligen > 2 gånger per dag
- 9.

2466

 84

67. Om Ni är/blir sömning eller sover dagtid, är Ni då mest sömning
klockan:

0. Inaktuellt
1. 8-10
2. 10-12
3. 12-14
4. 14-16
5. 16-18
6. Efter 18
- 9.

2467

 85

68. Drömmer Ni på nätterna?

1. Nej, aldrig
2. Bara någon enstaka gång < en gång per månad
3. 1-2 ggr per månad
4. 1-2 ggr per vecka
5. Nästan varje natt eller varje natt

9.

P 2468

86

69. Använder Ni sömntabletter?

1. Nej
2. Mindre än en gång per vecka
3. 1-2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan varje natt eller varje natt

9.

P 2469

87

70. Tar Er make/maka eller annan samboende också sömnmedel?

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja, sporadiskt (1 gång per månad - 1 gång per vecka)
3. Ja, mer eller mindre regelbundet (2-5 gånger per vecka)
4. Ja, alltid (6-7 gånger per vecka)

9.

2470

88

71. Muskelspänning

Avser upplevelse av muskelspänning och oförmåga att slappa av musklerna.

Särhålles från smärtor och värk.

0. Ingen upplevelse av muskelspänning. Ingen svårighet att slappna av 0,1
1. Måttlig tillfällig muskelspänning, speciellt i emotionellt laddade situationer 2,3
2. Besvärande muskelspänning, påtagligt svårt att finna bekväm sov- eller sittställning 4,5
3. Plågsam muskelspänning. Oförmåga att slappna av 6

9.

2471

89

72. Vegetativa störningar

Avser hjärtklappning, svettning, andningssvårigheter, yrsel och ostadighetskänsla, kalla händer och fötter, torrhet i munnen, orolig mage, gasspänningar, diarré, frekventa miktationer.

Särhålles från ångestkänslor, smärtor och värk och bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner.

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga vegetativa störningar rapporteras | 0,1 |
| 1. | Tillfällig vegetativa störningar i emotionellt laddade situationer | 2,3 |
| 2. | Ofta förekommande eller intensiva vegetativa störningar som är obehagliga eller besvärande | 4,5 |
| 3. | Mycket frekventa vegetativa störningar som är plågsamma eller invalidiserande | 6. |

9.

73. Minskad aptit.

Avser upplevelse av minskad aptit. Ökad aptit noteras, men skattas "0".

- | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 0-1 | Normal aptit. |
| 2-3 | Dålig matlust, men behöver inte tvinga i sig maten. |
| 4-5 | Aptit saknas nästan helt, maten smakar inte men tvingar sig att äta. |
| 6. | Måste övertalas att äta något överhuvudtaget. Matvägran. |

9.

74. Tvångstankar

Avser tvångsmässigt återkommande, besvärande eller skrämmande tankar eller tvivel som inte låter sig avfärdas, trots att de upplevs som irrationella eller sjukliga.

Särhålles från ångslighet, hypokondri, störningar i tankeförloppet, och upplevelser av kontroll och styrning.

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga tvångstankar | 0,1 |
| 1. | Tillfälliga tvångstankar som ej stör patienten nämnvärt | 2,3 |
| 2. | Frekventa och besvärande tvångstankar | 4,5 |
| 3. | Ständigt återkommande otäcka och invalidiserande tvångstankar | 6 |

9.

2472 ○ 90

2473 ○ 91

2474 ○ 92

75. Tvångshandlingar

Avser ett tvångsmässigt upprepande av vissa handlingar, som upplevs som irrationella eller sjukliga men inte kan motstås utan obehag.

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga tvångshandlingar | 0,1 |
| 1. | Lätt eller tillfälligt kontrolleringstvång eller annan tvångshandling | 2,3 |
| 2. | Påtagliga tvångshandlingar som dock ej stör patientens sociala funktioner | 4,5 |
| 3. | Tvångshandlingar som är tidskrävande och allvarligt inkräktar på patientens övriga aktiviteter | 6 |
| 9. | | |

2475 ○ 93

76. Fobier.

Avser upplevelser av irrationell fruktan eller ångest i specifika situationer (tunnelbana, buss, folksamlingar, trånga rum och liknande) vilka såvitt möjligt undviks.

- | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0-1 | Inga fobier. | |
| 2-3 | Vaga obehagskänslor i vissa situationer, som dock kan bemästras utan hjälp och med enkla åtgärder (sitta längst ut i raden på bio, undvika rusningstider och liknande). | |
| 4-5 | Specifika situationer framkallar konstant ångestkänslor och undviks därför som t ex att gå hemifrån ensam. | |
| 6. | Invaliderande och generaliserande fobier som starkt inskränker vanliga aktiviteter (t ex oförmögen att gå hemifrån). | |
| 9. | | |

2476 ○ 94

77. Överkänslighet för sinnesintryck

Avser överkänslighet för syn- och hörselupplevelser, vidare värmeöverkänslighet

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ingen överkänslighet | 0,1 |
| 1. | Lätt överkänslighet | 2,3 |
| 2. | Betydande överkänslighet. Använder hörselskydd, färgade glasögon | 4,5 |
| 3. | Invaliderande överkänslighet | 6 |
| 9. | | |

2477 ○ 95

PSYKIATRISK ANAMNES/STATUS

Observerade variabler

78. Motivation

0. Avvisande, kan ej förmås delta
1. Avvisande, negativ, men kan förmås delta
2. Avvisande, negativ, efterhand mindre avvisande
3. Ej avvisande, ej öppen opposition men negativ inställning
4. Accepterar undersökningen utan aktivt intresse
5. Accepterar undersökningen med aktivt intresse
6. Mycket entusiastisk till undersökningen
- 9.

2478 ○ 96

79. Utseende

1. Mycket ungdomlig
2. Ungdomlig, ser ut att vara 10 år yngre
3. Något ungdomlig, ser ut att vara 5 år yngre
4. Åldersadekvat
5. Något åldrad, ser ut att vara 5 år äldre
6. Mycket åldrad, ser ut att vara 10 år äldre
7. Mycket åldrad, ser mer än 10 år äldre ut
- 9.

2479 ○ 97

80. Tendens att associera till det förflutna

1. Neutral inställning
2. Måttlig tendens, jämför då och då situationen nu med sådan den var tidigare
3. Stark tendens, jämför ofta och utan säker anledning med det förflutna
4. Svår att avleda från det förflutna
-
- 9.

2480 ○ 98

81. Sänkt grundstämning.

Statusvariabel. Avser en sänkning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar dysterhet, tungsinne och nedstämdhet som manifesterar sig i mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baseras på utpräglingsgrad och avledbarhet. Förhöjd grundstämning skattas "0" på detta item.

- 0-1 Neutralt stämningsläge.
- 2-3 Ser genomgående nedstämd ut, men kan tillfälligt växla till ljusare sinnesstämning.
- 4-5 Ser nedstämd och olycklig ut oavsett samtalsämne.
6. Genomgående uttryck för extrem dysterhet, tungsinne eller förtvivlad olycka.
- 9.

2481 ○ 99

82. Förhöjd grundstämning

2482 ○ 100

Avser en förhöjning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar ökat välbefinnande, självsäkerhet, munterhet och upprymdhet som manifesterar sig i tal, val av samtalsämne, mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baserar sig på utpräglingsgrad och avledbarhet.

Sänkt grundstämning skattas "0" på detta item.

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Neutralt stämningsläge | 0,1 |
| 1. | Munter och självsäker, men kan utan svårighet växla till situationsadekvat allvar | 2,3 |
| 2. | Klart upprymd, överdrivet självsäker, vitsar och visar en munterhet som inte är avledbar | 4,5 |
| 3. | Genomgående uttryck för extrem upprymdhet och självkänsla | 6 |
| 9. | | |

83. Aggressivitet

2483 ○ 101

Avser irritabilitet, vrede eller aggressiva ord och handlingar. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens, den grad av provokation som framkallar aggressivt beteende och patientens avledbarhet.

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga iakttagbara uttryck för aggressivitet | 0,1 |
| 1. | Påstridig. Snäsigt och retligt, dock endast vid provokation | 2,3 |
| 2. | Verbal aggressivitet utan provokation. Grälar högljutt, slår näven i bordet, hötter med näven, men kan lugnas och talas tillrätta | 4,5 |
| 3. | Stark hotfullhet. Destruktiva handlingar. Fysiskt våld mot person | 6 |
| 9. | | |

84. Affektlabilitet

2484 ○ 102

Avser en snabb växling mellan motsatta affektiva reaktioner t ex alternerande tårar och skratt eller vrede och vänlighet. Bedömningen baseras på snabbhet, intensitet och frekvens av iakttagbara affektväxlingar under intervjun.

Särhålls från affektinkontinens och affektinkongruens.

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga plötsliga förändringar i stämningsläget | 0,1 |
| 1. | Livliga, ej överdrivna affektväxlingar | 2,3 |
| 2. | Tillfälliga snabba växlingar i affektyttringar | 4,5 |
| 3. | Påfallande täta och snabba växlingar mellan starka uttryck för motsatta affekter | 6 |
| 9. | | |

85. Minskad affektiv reaktivitet

Avser minskade eller uteblivna affekter och verbala eller mimiska uttryck för känslomässigt engagemang, affektiv avtrubning.

Särhålles från affektinkongruens och affektuttryck.

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ingen affektiv avtrubning | 0,1 |
| 1. | Förefaller oengagerad, men kan visa affekter | 2,3 |
| 2. | Ter sig påfallande oengagerad eller oberörd. Minimala affektiva reaktioner endast vid starka stimuli | 4,5 |
| 3. | Total avsaknad av uttryck för känslor | 6 |
| 9. | | |

2485 ○ 103

86. Affektinkontinens. Blödighet

Avser tendens till starka affektyttringar, vilka framkallas av till synes obetydliga stimuli.

Särhålles från affektlabilitet och affektinkongruens.

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck. | 0,1 |
| 1. | Tendens till överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga stimuli | 2,3 |
| 2. | Upprepad förekomst av överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga eller minimala stimuli | 4,5 |
| 3. | Minimala affektiva stimuli utlöser starka affektyttringar, vilka ej kan kontrolleras | 6 |
| 9. | | |

2486 ○ 104

87. Affektinkongruens

Avser iakttagna affektuttryck som ej motsvarar situationen eller samtalsämnet - t ex skratt när patienten berättar om nära vänners bortgång.

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Iakttagna affekter adekvata till situationen och samtalsämne | 0,1 |
| 1. | Enstaka lätt inadekvata affektuttryck | 2,3 |
| 2. | Tillfälliga uppenbart bisarra affektiva reaktioner. Omotiverat skratt eller gråt | 4,5 |
| 3. | Genomgående inadekvata eller grovt bisarra affektuttryck | 6 |
| 9. | | |

2487 ○ 105

88. Vegetativa störningar

Avser följande störningar: hyperventilation eller suckande andning, rodnad, svettning, kalla händer, vidgade pupiller, torrhet i munnen, svimning.

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga vegetativa störningar iaktas | 0,1 |
| 1. | Enstaka eller lätta vegetativa störningar under intervjun (t ex tillfällig rodnad, blekhet, handsvett), speciellt då emotionellt laddade områden berörs | 2,3 |
| 2. | Påtagliga vegetativa störningar vid flera tillfällen under intervjun, även då emotionellt indifferent samtalämnen berörs | 4,5 |
| 3. | Vegetativa störningar som medför att intervjun störs eller måste tillfälligt avbrytas | 6 |

9.

89. Sänkt vakenhetsgrad

Avser den observerade vakenhetsgraden sådan den avspeglas i mimik, kroppshållning och tal.

Särhålles från uppmärksamhet, perplexitet och minskad motorisk aktivitet.

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Fullt vaken | 0,1 |
| 1. | Dåsig. Gäspar enstaka gånger | 2,3 |
| 2. | Tenderar att falla i sömn när han lämnas i fred | 4,5 |
| 3. | Faller i sömn under intervjun, eller är svår att väcka | 6 |

9.

90. Distraherbarhet

Avser en störning i uppmärksamheten, som snabbt växlar och fångas av mer eller mindre relevanta yttre stimuli.

Särhålles från perplexitet och tankeflykt.

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Uppmärksamheten kvarhålles adekvat vid relevanta stimuli | 0,1 |
| 1. | Uppmärksamheten fångas tillfälligtvis av irrelevanta stimuli (t ex ljud i omgivningen) | 2,3 |
| 2. | Påfallande distraherbar | 4,5 |
| 3. | Olika obetydliga omgivningsstimuli fångar ständigt uppmärksamheten så att ett ordnat samtal omöjliggörs | 6 |

9.

2488 ○ 106

2489 ○ 107

2490 ○ 108

91. Självförsjunknenhet

Avser en inskränkning i uppmärksamheten på omgivningen eller andra människor.

Särhålls från sänkt vakenhetsgrad och perplexitet.

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Adekvat uppmärksam på omvärlden | 0,1 |
| 1. | Blir stundtals sittande i egna tankar, men kan utan svårighet fås att vända uppmärksamheten mot undersökaren | 2,3 |
| 2. | Ter sig under långa perioder "frånvarande", och undersökaren tvingas vid upprepade tillfällen påkalla uppmärksamheten | 4,5 |
| 3. | Helt autistisk. Förefaller inte reagera på tilltal eller beröring | 6 |

9.

92. Perplexitet

Avser svårighet att adekvat tolka och begripa omvärlden, rådvillhet, förvirring.

Särhålls från sänkt vakenhetsgrad, distraherbarhet och självförsjunknenhet.

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ingen perplexitet. | 0,1 |
| 1. | Tillfällig rådvillhet, som ej stör samtalet | 2,3 |
| 2. | Ter sig rådvill och undrande. Frågor måste upprepas för att innebörden skall förstås. Enstaka klart inkongruenta svar | 4,5 |
| 3. | Klart förvirrad, ter sig helt perplex. Går, talar och handlar som i en dröm. Svar på frågor och beteende under intervjun genomgående inkongruenta med situationen | 6 |

9.

93. Närminne

- | | |
|-----|--------------------------------------------------|
| 0-1 | Ingen nedsättning |
| 2-3 | Lätt nedsättning, tillfälligt osäker |
| 4-5 | Genomgående osäker |
| 6. | Stark nedsättning, ev. inslag av konfabulationer |

9.

94. Fjärrminne

- | | |
|-----|--------------------------------------------------|
| 0-1 | Ingen nedsättning |
| 2-3 | Lätt nedsättning, tillfälligt osäker |
| 4-5 | Genomgående osäker |
| 6. | Stark nedsättning, ev. inslag av konfabulationer |

9.

2491 ○ 109

2492 ○ 110

2493 ○ 111

2494 ○ 112

95. Desorientering.

Denna statusvariabel omfattar orientering till tid och rum.

- 0-1 Fullt orienterad.
 2-3 Viss osäkerhet om datum eller veckodag men för övrigt helt orienterad.
 4-5 Felaktig datumangivelse med mer än en vecka. Osäker orientering till plats.
 6. Klart desorienterad till tid eller rum.
 9.

P 2495 ○ 113

96. Ökat talflöde

Avser mångordighet och talträngdhet.
 Minskat talflöde skattas "0" på detta item.

0. Normalt talflöde utan längre pauser. 0,1
 1. Talar snabbt och är pratsam. Ger fylliga svar. 2,3
 2. Talet är flödande och ordrikt. Tar ofta initiativet till samtal och är svår att avbryta 4,5
 3. Tar hela tiden ledningen av samtalet och går ej att avbryta 6
 9.

2496 ○ 114

97. Minskat talflöde

Avser fåordighet, tröghet i talet, ökad latens och pausering. Hörselnedsättning, stamning och andra för samtalet relevanta förhållanden noteras.
 Ökat talflöde skattas "0" på detta item.

0. Normalt talflöde utan längre pauser 0,1
 1. Tar tid på sig och svarar kortfattat 2,3
 2. Extremt korta, ofta enstaviga svar som kan komma med påtaglig fördröjning. Säger nästan ingenting spontant 4,5
 3. Enstaviga svar fås fram med möda. Mutism 6
 9.

2497 ○ 115

98. Speciella talrubbningar

Avser stamning, dysarthri, atoni eller afasi. Typen av talrubbning skall anges, liksom eventuella påtagliga orsaker.
 Särhålls från bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner.

0. Ingen talrubbning 0,1
 1. Tillfällig förekomst av talrubbningar, speciellt i emotionellt laddade sammanhang 2,3
 2. Upprepad förekomst av talrubbningar även i emotionellt indifferent situationer. Rubbningen stör samtalet men intervjun kan genomföras utan svårighet 4,5
 3. Genomgående förekomst av talrubbningar som påtagligt försvårar samtalet 6
 9.

2498 ○ 116

99. Spärrning

Avser plötsliga oförmodade avbrott (blockering) av tal och uppmärksamhet, som varar ett par sekunder eller längre. Åtföljs ofta av orörlighet.

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ordinärt flytande tal | 0,1 |
| 1. | Vid enstaka tillfällen klipps talet av då emotionellt laddade områden berörs | 2,3 |
| 2. | Upprepad spärrning enligt ovan även då icke emotionellt laddade områden berörs | 4,5 |
| 3. | Genomgående spärrning som starkt försvårar samtalet | 6 |
| 9. | | |

100. Tankeflykt

Avser ett snabbt flöde av associationer i talet. Till skillnad från splittring finns ett samband, t ex i form av klangassociationer, mellan olika meningar, även om talets snabbhet kan göra det svårt att uppfatta.

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ingen tankeflykt | 0,1 |
| 1. | Fria, livliga associationer, med tendens till avsteg från samtalsämnet | 2,3 |
| 2. | Snabbt men följbart flöde av associationer. Byter ofta samtalsämne | 4,5 |
| 3. | Samtalet spårar ideligen ur. Associationernas rikedom och snabbhet gör ordnat samtal svårt eller omöjligt | 6 |
| 9. | | |

101. Splittring

Avser omständligt eller osammanhängande, till synes ologiskt tal med svårbegripliga kast från ämne till ämne, uppsplittring och fragmentering av satser och ord.

Särhålles från tankeflykt.

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Sammanhängande tal, utan svårighet begripligt | 0,1 |
| 1. | Pedantiskt och omständligt tal. Idiosynkratiskt användande av ord eller fraser, speciellt i emotionellt laddade sammanhang | 2,3 |
| 2. | Ologiskt sammanhang mellan ord och fraser även i emotionellt neutrala sammanhang. Enstaka ord och fraser faller ur sammanhanget. Tvära, svårbegripliga övergångar mellan olika samtalsämnen | 4,5 |
| 3. | Påfallande osammanhängande och ologiskt tal. Uppsplittring av satser eller ord eller förekomst av bisarra neologismer som allvarligt stör kommunikationen | 6 |
| 9. | | |

P 2499 ○ 117

P 2500 ○ 118

P 2501 ○ 119

102. Perseveration

Avser häftningstendens, kvarhållande med avseende på både tal och rörelse som t ex när ett och samma ämne ständigt återkommer, när ett svar på en fråga upprepas på efterföljande frågor, eller en tankegång eller handling inte kan avbrytas.

0. Ingen perseveration 0,1
1. Samma fras upprepas vid enstaka tillfällen. Återkommer flera gånger till samma fråga 2,3
2. Upprepar samma fras men kan förmås att ge mer adekvata svar. Har svårt att avbryta en påbörjad tankegång eller handling, men kan göra det efter uppmaning 4,5
3. Perseveration av ord eller handling gör samtal mycket svårt eller omöjligt 6
- 9.

103. Ökad motorisk aktivitet

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstiden innan en rörelse utföres, rörelsernas hastighet, antal och utsträckning.

Särhålles från motorisk rastlöshet (agitation) och ofrivilliga rörelser.

Minskad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

0. Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet. Ordinär latens vid påbörjande av rörelse 0,1
1. Livlig mimik, snabb gång, rikliga gester, men perioder av stillhet förekommer 2,3
2. Överdrivet stora eller snabba rörelser förekommer vid vissa tillfällen. Omedelbara motoriska reaktioner på stimuli. Gestikulerar påfallande mycket. Lämnar stolen vid enstaka tillfällen under intervjun 4,5
3. Ständig överdriven motorisk aktivitet. Kan ej förmås att sitta eller ligga stilla 6
- 9.

104. Minskad motorisk aktivitet

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstid, antal, hastighet och utsträckning.

Ökad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

0. Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet. Ordinär latens vid påbörjande av rörelser 0,1
1. Sparsam mimik, få gester och medrörelser 2,3
2. Nästan ingen spontan motorik. Långsam gång. Uttalad latens 4,5
3. Måste ledas in till intervjun. Ingen spontan motorik, inga mimiska rörelser. Stupor 6
- 9.

p2502 ○ 120

2503 ○ 121

2504 ○ 122

105. Motorisk rastlöshet (agitation)

2505 ○ 123

Avser icke målinriktad motorisk aktivitet som plockighet, handvridning och oförmåga att sitta stilla.

Särhålles från ökad motorisk aktivitet och ofrivilliga rörelser.

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Ingen motorisk rastlöshet | 0,1 |
| 1. | Svårt att hålla händerna stilla. Ändrar ställning flera gånger under samtalet. Plockar med föremål | 2,3 |
| 2. | Påtagligt rastlös. Vrider händerna och plockar intensivt med olika föremål. Gör ansatser att resa sig under samtalet | 4,5 |
| 3. | Kan inte förmås att sitta annat än för korta perioder. Vandrar av och an | 6 |

9.

106. Ofrivilliga rörelser

2506 ○ 124

Avser tics, tremor, choreoatetotiska rörelser, dyskinesier, dystonier eller torticollis. Typen specificeras

Särhålles från ökad motorisk aktivitet, motorisk rastlöshet eller rörelsestereotypier.

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga ofrivilliga rörelser | 0,1 |
| 1. | Tillfällig förekomst av ofrivilliga rörelser, ev. provocerade av emotionellt laddade situationer | 2,3 |
| 2. | Riklig förekomst av uttalade ofrivilliga rörelser, som accentueras när intervjun berör känsloladdade ämnen. Rörelserna kan kontrolleras så att de inte infererar med ordinära motoriska aktiviteter | 4,5 |
| 3. | Kontinuerlig förekomst av ofrivilliga rörelser, som allvarligt stör patientens intentionella motorik | 6 |

9.

107. Muskelspänning

2507 ○ 125

Avser graden av muskelspänning sådan den kan iaktas i kroppshållning, ansiktsuttryck och rörelser.

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Rör sig ledigt och obesvärat, sitter avspänt | 0,1 |
| 1. | Lätt spänd kroppshållning och mimik | 2,3 |
| 2. | Måttligt spänd kroppshållning och mimik. Spänd hals och käkmuskulatur. Kan inte sitta bekvämt under samtalet. Knyckiga eller stela rörelser | 4,5 |
| 3. | Påfallande spänd. Sitter styv och rak på yttersta stolskanten eller stelt hopkrupen med uppdragna axlar | 6 |

9.

108. Rörelsestereotypier

Avser upprepade eller stereotypa komplicerade rörelser eller ställningar, t ex paramimier, bisarra kroppsställningar eller rörelsesekvenser, katalepsi. Skattningen baseras på frekvens och den utsträckning i vilken andra aktiviteter störs.

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inga stereotypier | 0,1 |
| 1. | Tillfälliga eller tvivelaktiga stereotypier | 2,3 |
| 2. | Frekventa eller påtagliga stereotypier som tillfälligt dominerar motoriken | 4,5 |
| 3. | Uttalade stereotypier som helt ersätter ordinär mimik eller motorik | 6 |

9.

109. Hallucinatoriskt beteende

Avser bisartt beteende som kan förklaras av hallucinationer, t ex att tala till osynliga personer ("röster") eller förefalla skrämmd av synhallucinationer. Skattas oavsett om hallucinationer medges eller ej.

Särhålls från rörelsestereotypier och ofrivilliga rörelser.

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0. | Inget hallucinatoriskt beteende | 0,1 |
| 1. | Ovanligt beteende som t ex att tala för sig själv, som skulle kunna vara uttryck för hallucinationer men sannolikt ej är det | 2,3 |
| 2. | Uppenbart hallucinatoriskt beteende | 4,5 |
| 3. | Bisartt eller frekvent hallucinatoriskt beteende som stör samtalet | 6 |

9.

110. Skattningens tillförlitlighet

- | | |
|----|------------------------------------------------|
| 1. | Helt tillförlitlig |
| 2. | Tveksam för enstaka variabler |
| 3. | Genomgående tveksam för rapporterade variabler |

9.

111. Gradering av aktuell psykisk sjukdom

- | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Inga eller praktiskt taget inga psyk.symptom. |
| 1. | Lätta eller måttliga symptom. Pat:s funktion ej påverkad. |
| 2. | Måttliga symptom. Någon nedsättning i pat:s funktionsförmåga såsom vissa svårigheter att klara uppgifter i hemmet eller i arbetet. |
| 3. | Uttalade symptom med påtagligt nedsatt arbets/funktionsförmåga. Motverar sjukskrivning och i många fall också sjukhusintagning. |
| 4. | Svåra symptom, total oförmåga uträtta något arbete. Inkluderar psykotiska tillstånd och svåra demenser. |

9.

2508 ○ 126

2509 ○ 127

2510 ○ 128

2511 ○ 129

112. Asteniskt syndrom - global bedömning

2512 ○ 130

- 0. Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt nivå-sänkning
- 4-5 Måttlig till stark nivå-sänkning
- 6. Mycket stark nivå-sänkning
- 9.

113. Etiologi till asteniskt syndrom

2513 ○ 131

- 0. Bedöms ej föreligga
- 1. Senil
- 2. Arteriosclerotisk
- 3. Skallskada
- 4. Ethyl
- 5. Ethyl + skallskada
- 6. Infektion
- 7. Annan somatisk sjukdom

.....

- 8. Icke-organisk etiologi ss isolering (pseudodemens)
- 9.

114. Duration av asteniskt syndrom

2514 ○ 132

- 0. Bedöms ej föreligga
- 1. Mindre än 1/2 år
- 2. 1/2-1 år
- 3. 1-2.5 år
- 4. 2.5-3.5 år
- 5. 3.5-5.5 år
- 6. Mer än 5.5 år

.....

- 9.

115. Asteniskt syndrom - förlopp

2515 ○ 133

- 0. Föreligger ej
- 1. Progredierande
- 2. Fluktuerande
- 3. Stationärt

.....

- 9.

116. Affektivt syndrom - aktuellt (depr, neuroser se pos. 122)

- 0. Föreligger ej
- 1. UNS
- 2. Bipolär, manisk fas
- 3. Bipolär, depressiv fas
- 4. Unipolär, manisk fas
- 5. Unipolär, depressiv fas
- 6. Sannolikt bipolär
- 7. Sannolikt unipolär, depressiv fas
- 8. Sannolikt unipolär, manisk fas
- 9.

2516 ○ 134

117. Affektivt syndrom - tidigare

- 0. Föreligger ej
- 1. UNS
- 2. Bipolär
- 3. Unipolär, manisk typ
- 4. Unipolär, depressiv typ
- 5. Sannolikt bipolär
- 6. Sannolikt unipolär, manisk typ
- 7. Sannolikt unipolär, depressiv typ
- 9.

2517 ○ 135

118. Schizofren psykos

- 0. Bedöms ej föreligga nu eller tidigare
- 1. Kan möjligen ha förelegat tidigare, inga aktuella symptom
- 2. Har sannolikt förelegat tidigare, ingen säker defekt
- 3. Har sannolikt förelegat tidigare, säker defekt
- 4. Bedöms föreligga
-
- 9.

2518 ○ 136

119. Schizofreniform psykos, cykloid psykos och paranoisk psykos

- 0. Bedöms ej föreligga nu eller tidigare
- 1. Kan möjligen ha förekommit tidigare
- 2. Schizofreniform psykos har sannolikt förekommit tidigare
- 3. Cykloid psykos har sannolikt förekommit tidigare
- 4. Paranoisk psykos har sannolikt förekommit tidigare
- 5. Schizofreniform psykos bedöms föreligga nu
- 6. Cykloid psykos bedöms föreligga nu
- 7. Paranoisk psykos bedöms föreligga nu
-
- 9.

2519 ○ 137

120. Aktuella ångest-, depressiva, anankastiska besvär. Huvudbesvär anges

0. Bedöms ej föreligga
1. Långdragen sorgereaktion
2. Ångest, akut eller subkronisk
3. Ångest, kronisk
4. Depressiv
5. Hyponondrisk
6. Fobisk
7. Obsessiv-kompulsiv
8. Hysterisk

Beskriv närmare

.....

.....

9.

121. Aktuella ångest-, depressiva, anankastiska besvär - duration

0. Föreligger ej
1. Mindre än 1/2 år
2. 1/2-1 år
3. 1-2.5 år
4. 2.5-3.5 år
5. 3.5-5.5 år
6. Mer än 5.5 år

Ange även tidigare neuros

.....

9.

122. Aktuella ångest-, depressiva, anankastiska besvär - etiologi

0. Neuros föreligger ej
1. Somatogen
2. Psykogen
3. Karaktärogen
4. Kryptogen
5. 1+2
6. 1+3
7. 2+3
8. 1+2+3

Beskriv närmare

.....

9.

2520 ○ 138

2521 ○ 139

2522 ○ 140

123. Aktuella ångest-, depressiva, anankastiska besvär - förlopp

- 0. Bedöms ej föreligga
- 1. Episodiskt
- 2. Periodiskt
- 3. Progredierande
- 4. Kroniskt
- 5. Exacerbation
- 6. Tidigare sjuk - annan symptomatologi
- 9.

2523 ○ 141

124. Oligofreni

- 0-1 Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt. Ej socialt handikappad
- 4-5 Måttlig-stark. Socialt handikappad
- 6. Kraftig. Institutionell vård indicerad
- 8. Kan ej säkert bedömas p g a aktuell insuff, eller nivå-sänkning
- 9.

2524 ○ 142

125. Ethyl

- 0. Absolutist
- 1. Ej absolutist, intet abus
- 2. Enstaka sociala komplikationer, intet medicinskt vård-behov
- 3. Sociala och/eller medicinska komplikationer. Behov av/erhållit ambulansvård, dock ej psykiatrisk
- 4. Som 3 men Behov av/erhållit ambulans psykiatrisk vård
- 5. Alc. chron, erhåller ej sluten psyk.vård
- 6. Alc. chron, erhåller sluten psyk.vård
- 9.

2525 ○ 143

126. Ethylmissbruk - duration

- 0. Bedöms ej föreligga eller ha förelegat
- 1. Redan före 20 års ålder
- 2. 20-60 års ålder
- 3. Efter 60 års ålder
- 4. 1+2
- 5. 1+3
- 6. 2+3
- 7. 1+2+3
- 9.

2526 ○ 144

127. Tycker Ni att det är naturligt att människor i Er egen ålder har sexuella intressen och behov?

1. Ja, absolut
2. Ja, om gifta
3. Individuellt
4. Tveksamt
5. Nej
6. Vet ej
7. Vägrar att svara
8. Tillfrågas ej
- 9.

p 2527 ○ 145

128. Ändring i sexualdriften sista 2 åren

1. Ökning
2. Oförändrad
3. Lätt minskning
4. Kraftig minskning
5. Vet ej
6. Vägrar att svara
7. Tillfrågas ej p g a reaktion
8. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
- 9.

2528 ○ 146

129. Ändring i sexuell tillfredsställelse under de sista 2 åren

1. Ökning
2. Oförändrad
3. Lätt minskning
4. Kraftig minskning
5. Vet ej
6. Vägrar att svara
7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
- 9.

2529 ○ 147

130. Sexuell aktivitet nu

0. Örfaren eller upphört
1. Aktivitet en gång per månad eller glesare
2. Två gånger per månad
3. En gång per vecka
4. Mer än en gång per vecka
5. Vet ej
6. Tillfrågas ej p g a pat:s reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
- 9.

2530 ○ 148

131. Anledning till att heterosexuell aktivitet har upphört

- 0. Frågan ej aktuell
- 1. Makes/makas död
- 2. Separerad eller fränskild
- 3. Makes/makas sjukdom
- 4. Makes/makas förlust av sexuell intresse
- 5. Make/maka oförmågen till sexuell aktivitet
- 6. Själv sjuk
- 7. Själv förlorat intresset
- 8. Själv oförmågen till sexuell aktivitet
- 9.

P 2531 ○ 149

132. Reaktion på att sexuell aktivitet upphört

- 0. Frågan ej aktuell
- 1. Bra
- 2. Likgiltig, spelar ingen roll
- 3. Saknad i början, nu likgiltighet
- 4. Saknad hela tiden
- 5. Stark saknad
- 6. Tillfrågas ej
- 9.

2532 ○ 150

133. Förekomst av sexuell funktionsnedsättning

- 0. Ej sexuell aktiv
- 1. Sexuellt aktiv, betr. män inget av nedanstående alternativ
- 2. Erektionsimpotens
- 3. Ejakulationsimpotens
- 4. Ejakulatio praecox
- 5. Betr. kvinnor: Orgasm uteblir alltid
- 7. Betr. kvinnor: Orgasm uteblir ofta
- 7. Betr. kvinnor: Orgasm uteblir ibland, ibland inte
- 8. Betr. kvinnor: Orgasm uteblir sällan eller aldrig
- 9.

2533 ○ 151

134. Sexuella drömmar, aktuellt

- 0. Minns inget dröminnehåll
- 1. Aldrig
- 2. Sällan
- 3. Ibland
- 4. Ofta
- 5. Vet ej
- 6. Tillfrågas ej p g a pat:s reaktion
- 7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
- 9.

P 2534 ○ 152

135. Sexuella fantasier i vaket tillstånd

1. Aldrig
2. < 1 gång per månad
3. 1-3 gånger per månad
4. 1 gång per vecka
5. 2-5 gånger per vecka
6. Dagligen eller nästan dagligen
7. Vet ej
8. Tillfrågas ej
- 9.

P 2535

○ 153