

2009-03-22

Undersökningsformulär

H85

2009

Probandnummer: 8 5- _____ - 8 5

Intervjuare: _____

Datum (år/månad/dag): _____ / _____ / _____

Undersökningsformulär

Bortfall markeras med 9, 99, 999, 9999

PSF 1. Kompletterande anamnes tagen från _____

0. Ej tagit kompletterande anamnes
1. Make/sambo
2. Barn
3. Syskon
4. Vårdhem/sjukhuspersonal
5. Journalhandlingar
6. Annan
7. Kombination
- 9.

ANTROPOMETRI

- US1** Kroppslängd (cm) _____
- US2** Underbenslängd (cm) _____
- US3** Omkrets midja/navel (cm) _____
- US4** Omkrets stuss (cm) _____
- US5** Överarmsomfång (cm) _____
- US6a** Vikt (tiondels kg) _____, _____
- US6b** (egen/annan våg) (tiondels kg) _____, _____

SITTANDE BLODTRYCK (Efter 5 minuters vila)

- US7a** Sittande syst (mmHg) _____
- US7b** Sittande diast (mmHg) _____
- US7c** Pulsfrekvens, sittande _____

US8. BENÖDEM _____

1. Nej. Har inte benödem.
2. Ja, endast vrister
3. Ja, underben + vrister antytt eller måttligt
4. Ja, underben + vrister uttalat

US9 ÄRR EFTER HÖFTOPERATION _____

1. Nej. Har inte ärr.
2. Ja. Vänster
3. Ja. Höger
4. Ja. Bilateralt

US10 BLODPROVER _____

1. Ja
2. Nej (spec)

Specificera: _____

US11 EKG _____

1. Ja
2. Nej (spec)

Specificera: _____

BLODTRYCK OCH PULS

US7d	Ankeltryck enl. Mr Os (Hö ben)	_____
US7e	Liggande (efter 5 min vila) syst (mmHg)	_____
US7f	Liggande (efter 5 min vila) diast (mmHg)	_____
US7g	Pulsfrekvens, liggande (efter 5 min vila)	_____
US7h	Stående 1 min syst (mmHg)	_____
US7i	Stående 1 min diast (mmHg)	_____
US7j	Pulsfrekvens, stående 1 min	_____
US7k	Stående 3 min syst (mmHg)	_____
US7l	Stående 3 min diast (mmHg)	_____
US7m	Pulsfrekvens, stående 3 min	_____

SPIROMETRI

1:a försöket

US12a	FEV 1.0 (dl/min)	_____, _____
US12b	FVC	_____, _____

2:a försöket

US12c	FEV 1.0 (dl/min)	_____, _____
US12d	FVC	_____, _____

PEF

US12e	PEF	_____
US12f	PEF	_____
US12g	PEF	_____

POX/GÅNGTEST

Pulsoximeter före gångtest (2 min mellan de två POX-mätningarna)

US13a %SaO2 _____ US13b PULS _____

US13c %SaO2 _____ US13d PULS _____

US13jx Gångtest (20 meter, normala gågtakt) _____ sek

US13ex Gångtest (20 meter, så fort som möjligt) _____ sek

Pulsoximeter efter gångtest (2 min mellan de två POX-mätningarna)

US13f %SaO2 _____ US13g PULS _____

US13h %SaO2 _____ US13i PULS _____

PALLTEST

US14a Klarar **uppstigning** på pallhöjd utan räcke minst _____

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

US14c Klarar **uppstigning** på pallhöjd med räcke minst _____

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

US15 IMPEDANS _____

1. Ja
2. Nej (Spec.)

Specificera: _____

SKÄRPT ROMBERG

(Armarna utefter sidorna, tandemstående, valfri fot, max 30 sek. Om foten flyttas eller kraftig svaj, avbryts testet.)

Tid till fall:

US16a tittar _____ sek

US16b blundar _____ sek

CHAIR STANDING (Uppresning till stående från stol med armstöd.)

”Håll armarna i kors över bröstet när du reser dig.” (Om det inte går, tillåt uppresning på annat sätt.)

US17a Stolhöjd (cm) _____

(Mottagningsstolen 45cm)

US17b Klarar uppresning; _____

1. Ja
2. Nej

US17c Om ja; _____

1. Med armarna i kors över bröstet
2. Med stöd av händerna på låren (Klarar inte 1)
3. Med hjälp av armstöd (Klarar inte 1 eller 2)

HANDSTYRKA ENLIGT VIGORIMETER

Höger hand (bäst av tre värden)

US18a a) Största blåsan (männen) _____ kPa

US18b b) Mellanstora blåsan (kvinnor) _____ kPa

Vänster hand (bäst av tre värden)

US18c a) Största blåsan (männen) _____ kPa

US18d b) Mellanstora blåsan (kvinnor) _____ kPa

JAEGERTAVLA 1

US19a. (med ev egna läsglas) _____

1. Läser J III (=6 p)
2. Läser J III med ev eget förstoringsglas
3. Läser J VII (=10p)
4. Läser J VII med ev eget förstoringsglas
5. Kan ej läsa
8. Klarar J III (=6 p) med +1.0 add. o.a
- 9.

US19b JAEGERTAVLA 2

(med ev egna läsglas)

1. Läser 12p _____
2. Läser 10p
3. Läser 8p
4. Läser 6p
5. Läser 5p

US19c Synhjälpmedel (vid undersökningstillfället)

1. Ja. (Spec.)
2. Nej

Specifiera: _____

STA 53. Ofrivillig motorik (global bedömning) _____

Skatta högsta av 54-68.

Avser tics, tremor, choreoatetotiska rörelser, dyskinesier, dystonier eller torticollis. Typen specificeras Särhålles från ökad motorisk aktivitet, motorisk rastlöshet eller rörelsestereotypier.

- 0-1 Inga ofrivilliga rörelser
- 2-3 Tillfällig eller lätt förekomst av ofrivillig motorik, ev. provocerade av emotionellt laddade situationer
- 4-5 Riklig förekomst av uttalad ofrivillig motorik. Den ofrivilliga motoriken kan kontrolleras så att den inte interfererar med ordinära motoriska aktiviteter
- 6. Kontinuerlig förekomst av ofrivillig motorik, som allvarligt stör patientens intentionella motorik
- 9.

Typ av motorisk störning (skattas 0-6 enligt ovan)

STA 54. Tics _____

STA 56. Choreoatetotiska rörelser _____

STA 57. Dyskinesier _____

(abnorma rörelser, rörelsesvårigheter, smärtsamma rörelser)

STA 58. Dystonier inkl. torticollis _____

(onormal muskelspänning, muskelstelhet, stelhet i nacken)

STA 59. Myoklonier _____

(små ep-rörelser)

STA 60. Katatoni _____

(spänningstillstånd med stelhet i musklerna vid schizofreni)

STA 61. Akinesi _____

(orörlighet, långsamt rörelsemönster, parkinsonism, maskansikte, kughjulsfenomen)

STA 62. Pelvicrural flexionskontraktur _____

(slutstadium vid demenssjukdom, fosterställning, kontrakturer)

STA 63. Motor impersistens _____

(oförmåga att hålla kvar en rörelse, t.ex att hålla tungan ute en längre tid)

STA 64. Fokalneurologiska symtom _____

(ensidiga strokesymtom t.ex högersidig pares)

STA 66. Bipyramidala symtom _____
(pares bägge sidor, t.ex förlamning bägge armar)

STA 67. Motor perseveration _____
(oförmåga att avbryta en rörelse, ett rörelseschema)

STA 68. Annat _____

STA 69. Gångstörning _____
0. Saknas
1. Finnes lätt
2. Finnes mer uttalat

Specificera: _____

STA90. Medvetandegrad _____
1. Utan anmärkning
2. Somnolent
3. Soporös
4. Stuporös
5. Comatös
9.

STA 55b. Tremor _____
1. Nej
2. Ja, grovvågig antydd
3. Ja, grovvågig måttlig
4. Ja, grovvågig uttalad
5. Ja, finvågig
9.

STA 61b. Hypokinesi _____
1. Nej
2. Ja, antydd
3. Ja, måttlig
4. Ja, uttalad
9.

STA 65b. Rigiditet

1. Nej
2. Ja, antydd
3. Ja, måttlig
4. Ja, uttalad
- 9.

STA 64b. Pareser

- | | |
|---------------|--------------|
| 11 Nej | 2. Facialis |
| 2. Höger | 3. Arm |
| 3. Vänster | 4. Ben |
| 4. Bilateralt | 5. 2 + 3 |
| | 6. 2 + 4 |
| | 7. 3 + 4 |
| | 8. 2 + 3 + 4 |
| | 99 |

STA 64cx. Pareser

0. Inaktuellt
1. Central eller perifer pares
- 9.

STA64d. Grassé.

- 1 Utan anmärkning
- 2 Pos. höger
- 3 Pos. vänster
